

JEFO DAIRY FAT 99%

WOLNE KWASY TŁUSZCZOWE C16

Tłuszcz tłuszczowi nierówny.

Liczy się to, co krowa faktycznie wchłonie. Najwięcej przyswajalnego kwasu palmitynowego z każdego grama, bez obciążania żywca.



99% tłuszczu

min. 85% C16:0

niezależny od pH żywca

99%

czystego tłuszczu

Minimum 99% tłuszczu surowego. Płacisz za tłuszcz, nie za wypełniacz.

85%

kwasu palmitynowego C16:0

Gwarantowane minimum, typowo 88%. To C16 buduje tłuszcz mleka.

+0,23

p.p. tłuszczu w mleku

Średnio w 12 badaniach, bez spadku pobrania paszy i kondycji.¹

01

Więcej tłuszczu w mleku

C16 trafia do gruczołu mlekowego z krwi, z pominięciem żywca. Wyższy tłuszcz to wyższa cena za litr.

02

Energia, gdy jej brakuje

Po wycieleniu krowa je mniej, niż potrzebuje. Energia z tłuszczu łagodzi ujemny bilans bez dokładania skrobi.

03

Mniejsza utrata kondycji

Stabilna kondycja po wycieleniu to lepszy punkt wyjścia do rozrodu.

04

Bezpieczny dla żywca

Nie zakłóca fermentacji i nie hamuje bakterii trawiących włókno, także przy niskim pH.

DAWKA

ok. 350 g / krowę /
dzień

FORMA

granulat do mieszanek i
TMR

OPAKOWANIE

worek 25 kg lub big
bag

Zapytaj o cenę
info@tychera.pl · tychera.pl

PORÓWNANIE

Wyglądają podobnie. Krowa traktuje je zupełnie inaczej.

Na rynku są trzy główne formy tłuszczów paszowych bogatych w C16. Różnią się tym, czego nie widać na etykiecie: ile C16 zawierają, czy przetrwają żwacz i na co krowa zużyje energię.^{5,6,7}

Porównuj koszt grama przyswajalnego C16, a nie cenę za tonę. Przy dawce 300 g krowa dostaje z JEFO **255 g C16**, z typowych soli wapniowych około **120 g**.

TRZY FORMY TŁUSZCZU C16

	Trójglicerydy	Sole wapniowe	JEFO Dairy Fat 99%
Zawartość C16	różna	ok. 36–60%	min. 85%
Strawność	niska, ok. 40%	dobra	wysoka
Stabilność w żwaczu	obojętne	zależna od pH	niezależna od pH
Główny efekt	ograniczony	masa ciała	tłuszcz mleka

2,1×

więcej C16 niż z typowych soli wapniowych

42%

C16 z paszy trafia do mleka; C18:0 tylko ok. 24%⁸

JAK DZIAŁA

Z paszy prosto do tłuszczu mleka.

01 · ŻWACZ

Przechodzi bez zmian

Nasycone wolne kwasy tłuszczowe o temperaturze topnienia 61°C nie ulegają przemianom w żwaczu, niezależnie od pH. Fermentacja i trawienie włókna pracują normalnie.

02 · JELITO CIENKIE

Wchłania się od razu

Wolne kwasy nie wymagają rozkładu, więc krowa nie traci energii na trawienie tłuszczu. Niewielki udział kwasu oleinowego wspiera emulgację.


03 · GRUCZOŁ MLEKOWY

Buduje tłuszcz mleka

Gruczoł mlekowy wbudowuje C16 bezpośrednio w tłuszcz mleka. Dlatego to kwas palmitynowy, a nie stearynowy, podnosi tłuszcz w mleczarni.

BADANIE DAWKA-EFEKT

Najwięcej tłuszczu przy ok. 350 g C16 dziennie.



kg tłuszczu mlecznego na krowę dziennie przy rosnącej dawce C16. Oś od 1,4 kg. Wyższa dawka nie dała więcej tłuszczu, dlatego dawkę ustala doradca.² W 10-tygodniowym badaniu: +3,8 kg mleka i +0,20 p.p. tłuszczu dziennie.⁴

STOSOWANIE

Do mieszanek i TMR.

Dla kogo	mieszanki dla krów w laktacji, szczególnie po wycieleniu
Dawka	ok. 1,5% s.m. dawki, ok. 350 g/szt./dzień
Podanie	mieszanki paszowe, TMR
Producent	JEFO Nutrition, Kanada · surowiec RSPO

Kartę techniczną przekazujemy na zapytanie.

Zapytaj o cenę i dostępność.

HANDEL

ŁP

Łukasz Perlik
+48 798 815 812
info@tychera.pl

ADRES

T

Tychera
ul. Zamojskich 3B lok. 6
63-000 Środa Wielkopolska